ТЕРМОХИМИЯ НИТРОЗОАРЕНОВ.

СООБЩЕНИЕ 2. ЖИДКОФАЗНЫЙ РАСПАД НИТРОЗОАРЕНОВ

Ключевые слова: моно-нитрозоарен, термораспад в жидкой фазе.

Проведен анализ реакций термораспада нитрозоаренов в жидкой фазе.

Key words: mono-nitrosoarenes, thermal decomposition in the liquid phase.

The analysis of liquid phase thermal decomposition reactions of nitrosoarenes was conducted.

Введение

Данное сообщение посвящено обобщению и анализу реакций термораспада нитрозоаренов в жидком агрегатном состоянии [1] как модельных структур С-нитрозных систем вулканизации.

Экспериментальная часть

Исходные соединения: 4-нитрозо- N,N' -диметиланилин (НДМА) и 4-нитрозо- N,N' -диэтиланилин (НДЭА) использовались реактивные и подвергались дополнительной очистке перекристаллизацией из спирта. Нитрозобензол, 3-нитрозотолуол, 4-нитрозотолуол, 2-хлорнитрозобензол, 3-хлорнитрозобензол, 4-хлорнитрозобензол, 2-бромнитрозобензол, 3-бромнитрозобензол, 4-бромнитрозобензол синтезировались из соответствующих нитроаренов восстановлением до арилгидроксиламинов с последующим окислением до нитрозопроизводных и очисткой по общей методике [2], 2-нитрозотолуол получался по методике [3].

Манометрический метод. Термораспад нитрозоаренов в жидкой фазе, в расплаве, сопровождается выделением газообразных продуктов, в связи с этим формально-кинетические закономерности разложения исследуемых веществ определялись по изменению давления газов в пирексовых реакторах- манометрах типа Бурдона по методике [4]. Термическое разложение в интервале $60 \div 95^\circ\text{C}$ проводилось в жидкостном термостате при использовании в качестве теплоносителя воды, при $100 - 140^\circ\text{C}$ - глицерина. Колебания температуры не превышало $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Изменение давления регистрировалось по ртутному или дибутилфталатному U-образному манометру. Соотношение массы навески к свободному объему реактора составляло $m/V = 0,06 \div 0,1 \text{ г/см}^3$.

Хроматографический анализ. Анализ газов проводился методом ГЖК на хроматографе ЛХМ-8МД, газ носитель гелий, 40 мл/мин, сорбент поропак Q. Продукты распада (CO_2) разделяли при 20°C на колонке 4 мм длиной 1 метр, (N_2 , CO , N_2O) при 90°C на колонке диаметром 4 мм и длиной 1,5 метра. ТСХ исходных веществ и продуктов их термолиты проводилась на хроматографических пластинках "Silufol UV-254", в качестве элюента использовались бензол, гексан, диэтиловый эфир, ацетон, изопропанол, метанол,

марок "х.ч.". Хроматограммы проявлялись под ультрафиолетовой лампой со светофильтром UV-254.

Масс-спектрометрический анализ. Масс-спектры индивидуальных веществ, их газообразных и конденсированных продуктов распада записывались на масс-спектрометре высокого разрешения с двойной фокусировкой МХ-1310 при энергии ионизирующего излучения 70 и 20 эВ и использовании системы прямого ввода образцов.

Квантовохимические расчеты. Оптимизация геометрических параметров молекул, расчет термодинамических величин, поиск переходных состояний систем проводились при использовании пакета Gaussian-98, на компьютерном кластере КНИТУ(КХТИ) при поддержке грантом РФФИ № 03-07-90092.

Анализ методом электронного парамагнитного резонанса стабильных радикалов проводился на спектрометре "Radiopan EPR Spectrometer SE/X 2544.

Кинетика термораспада нитрозоаренов в жидкой фазе, расплаве

Температурная зависимость скоростей термораспада соединений оценивалась по начальным участкам кривых газовой выделения (табл. 1). Последние, при глубинах разложения выше $1 \div 2\%$ приобретают характер самоускорения и трансформируются в S-образный вид. Кривая термораспада нитрозобензола существенно отличается от остальных нитрозоаренов, и имеет индукционный период, за которым следует стадия, формально подчиняющаяся уравнению реакции первого порядка до глубины разложения $95 \div 98\%$. (рис. 1).

Индукционный период термолиты нитрозобензола не сопровождается газовой выделением, однако расплав меняет свой цвет от изумрудно-зеленого до красно-бурого, что говорит о химических процессах с участием нитрозогруппы. Отсюда следует, что полученные для нитрозобензола аррениусовские параметры газовой выделения, в отличие от других исследованных нитрозоаренов характеризуют вторичные процессы его термолиты.

В конденсированных продуктах начальной стадии термолиты нитрозобензола методом ТСХ, по величинам R_f были идентифицированы

нитробензол, азоксибензол, дифениламин и анилин. В масс-спектре, наряду с молекулярным пиком исходного нитробензола (m/z 107), обнаружены пики дифенилнитроксила (m/z 184), дифениламина (m/z 169), азоксибензола (m/z 198), дибензофурана (m/z 168), нитробензола (m/z 123), дифенилового эфира (m/z 170), анилина (m/z 93), бензола (m/z 78) и воды (m/z 18).

Рис. 1 - Жидкофазный распад нитробензола в расплаве

На рис. 2 представлена температурная зависимость кривых термораспада 4-нитротолуола в расплаве, характерная для других нитротолуолов, хлорнитробензолов и 4-нитро-N,N'-диалкиланилинов.

Рис. 2 - Жидкофазный распад 4-нитротолуола в расплаве

Таблица 1 - Аррениусские параметры термораспада нитроаренов в расплаве

Соединение	E ± 8, кДж/моль	lg A ± 0,3, c⁻¹	T _{стаб} °C	ΔH _{исп} ± 4, кДж/моль
Нитробензол	60	4,7	-	49,9
2-Нитротолуол	118	12,3	65	55,8
3-Нитротолуол	119	12,6	62	42,1
4-Нитротолуол	128	13,2	76	43,3
2-Хлорнитробензол	137	13,3	96	54,8
3-Хлорнитробензол	120	12,7	62	43,0
4-Хлорнитробензол	130	13,3	79	43,3
НДМА	135	12,8	103	-
НДЭА	114	9,3	116	-

За уровень термостабильности принята условная температура T_{стаб} °C, определяемая из Аррениусовских параметров, при которой константа скорости термораспада k=1·10⁻⁶, c⁻¹.

При анализе спектров ЭПР продуктов начальных стадий распада нитробензола, нитротолуолов и хлорнитробензолов зафиксированы триплетные сигналы (1:1:1) со сверхтонким расщеплением, характерным для диарильных нитроксильных радикалов [5]. На рис. 3 приведен спектр ЭПР продуктов жидкофазного распада нитробензола, идентичный дифенилнитроксилу.

Рис. 3 - Спектр ЭПР продуктов жидкофазного термораспада нитробензола

В газообразных продуктах жидкофазного распада нитроаренов идентифицированы азот, углекислый газ и окись углерода. Окислы азота не обнаружены (табл. 2).

Таблица 2 - ГЖХ газообразных продуктов распада нитроаренов

Соединение	N ₂	CO ₂	CO
Нитробензол	34,81	54,74	9,65
2-Нитротолуол	37,42	48,86	13,72
3-Нитротолуол	43,04	49,37	7,59
4-Нитротолуол	38,93	49,39	11,68
2-Хлорнитробензол	50,30	42,45	7,25
3-Хлорнитробензол	50,12	41,76	8,12
3-Бромнитробензол	49,79	44,30	5,91
НДМА	28,81	66,66	6,53

Анализ термического разложения нитроаренов в жидкой фазе

В отличие от твердой фазы в жидком состоянии (расплаве) орто- и пара- замещенные нитроарены проявляют более высокую чем мета-производные термостабильность (см.табл. 1). В предыдущем сообщении 1 [6] было показано, что ΔH_{пл} орто- и пара- замещенных несколько ниже чем у соответствующих мета- производных.

Действительно, относительно высоким величинам ΔH_{пл} мета-замещенных бис-нитроаренов, свидетельствующим о меньшей чем у орто- и пара- производных степени ассоциации в расплаве, соответствуют и меньшие величины теплот испарения ΔH_{исп}. При этом, за исключением орто-нитротолуола, низким значениям ΔH_{исп}

соответствуют и низкие величины $T_{\text{стаб}}$ нитрозоаренов.

Несколько по иному ведут себя НДМА и НДЭА, которые согласно литературным данным существуют в виде мономеров зеленого цвета [7] не способных к реакциям димеризации и, очевидно, к присущей другим нитрозоаренам межмолекулярной ассоциации нитрозогрупп в расплаве. Именно этим, в первую очередь, объясняется то, что нитрозоанилины имеют наибольшую термостабильность в ряду исследованных нитрозоаренов. По видимому, механизм термораспада нитрозоанилинов в расплаве отличается от разложения других нитрозоаренов, склонных к образованию в расплаве ассоциатов между нитрозогруппами. Таким образом, ряд факторов, включая хиноидность структуры, а также отсутствие в продуктах термолитиза нитроксильных радикалов у нитрозоанилинов, является следствием их сравнительно повышенной термостабильности.

Проведенный квантовохимический расчет методом DFT B3LYP 6-31G(d) мономера, димера и межмолекулярного ассоциата по нитрозо и аминогруппам нитрозоанилина показал, что термодинамически выгоднее на 29,35 кДж/моль существование последнего. Существование димера 4-нитрозоанилина, как по расчетным, так и по экспериментальным данным термодинамически менее выгодно:

Существование ассоциатов за счет межмолекулярных водородных связей $-\text{N}=\text{O} \cdots \text{H}-\text{N}-$ 2,6 ÷ 2,8 Å в виде тримера, в большей степени моделирующее межмолекулярное взаимодействие в 4-нитрозоанилине, представлено на рис. 4.

В данном случае оптимизация геометрических параметров тримоллекулярного ансамбля показала выигрыш в теплоте образования по сравнению с мономером в 30,1 кДж/моль и увеличению степени «хиноидно-N-оксидности», $\text{C}=\text{N}-\text{O}$.

В случае справедливости расчетных данных $T_{\text{стаб}}$ нитрозоанилинов должна быть близкой к термостабильности производных N-оксидов. Действительно, анализ данных показывает, что $T_{\text{стаб}}$ нитрозоанилинов приближается к значениям $T_{\text{стаб}}$ некоторых пиридин-N-оксидов [8].

Рис. 4 - Оптимизированное геометрическое строение межмолекулярного ассоциата трех нитрозоанилинов методом B3LYP/6-31G(d)

Совокупность полученных в результате изучения данных кинетики и продуктов термолитиза С-нитрозоаренов в жидкой фазе впервые была описана в работах [9, 10] в виде следующей схемы распада:

Данная схема, в частности, позволяет предположить механизм образования анилина в конечных стабильных продуктах распада через промежуточный фенилнитрен.

Лимитирующей стадией термолитиза нитробензола в конденсированной фазе является стадия образования активированного комплекса TS, с последующим образованием и распадом нестабильного N-нитрозоэфира.

Действительно, активационные параметры начальных стадий термораспада нитрозоаренов в расплаве составили 114 ÷ 137 кДж/моль (табл. 1), что значительно меньше величины энергии диссоциации C-N в газовой фазе для $\text{Ph}-\text{NO} = 51,5 \text{ ккал/моль} (215,5 \text{ кДж/моль})$ [11].

Образование в продуктах распада, CO_2 , CO , H_2O , N_2 и других соединений объясняется последующими окислительно-восстановительными процессами.

Вывод

Нитрозоарены в конденсированной фазе, например в процессе реакции модификации или вулканизации непредельных каучуков, способны претерпевать собственный термораспад, что необходимо учитывать при разработке эластомерных композиций.

Литература

1. Ключников О. Р. *Термораспад производных N-оксидов и ароматических C-нитрозосоединений*. Дисс. канд. хим. наук, Казанский хим.-технол. институт, Казань, 1990. 108 с.
2. Родионов В.М., Богословский Б.М., Федорова А.И. *Лабораторное руководство по химии промежуточных продуктов и красителей*. М.: Госхимиздат, 1948. С.59.
3. Miecznikowska-Stolarczuk W., Sokolowska A., Frankiewicz Z., Klapecka B. *Soc. Scient. Lodz. acta chim.* **12**, 109-113 (1967).
4. Гольбиндер А.Т. *Лабораторные работы по курсу теории взрывчатых веществ*. М.: Росвузиздат, 1963. С. 9.
5. *Landolt-Bornstein. V 9. Part 1. Diaryl nitroxides*. Berlin. 556-582 (1979).
6. Ключников О. Р. Термохимия нитрозоаренов. Сообщение 1. Термораспад нитрозоаренов в твердой фазе. *Вестник Казан. технол. ун-та*, **4**, 117-120 (2014).
7. *Общая органическая химия* / Под ред. Д. Бартона и У. Д. Оллиса. Т. 3. *Азотсодержащие соединения*. М.: Химия, 1982. 736 с.
8. Ключников О. Р., Никишев Ю. Ю. Термостабильность и термораспад производных N-оксидов. *Химия гетероцикл. соед.* **11**, 1573 - 1576 (1995).
9. Ключников О. Р. Кинетика и механизм термораспада нитрозоаренов в газовой фазе и расплаве. *Матер. Всеросс. конф. «Энергетические конденсированные системы»*, 28-31 окт. 2002 г., Черногловка. М.: Янус-К. 2002. С. 92 -93.
10. Ключников О. Р. Аррениусовские параметры и механизм термораспада нитрозоаренов. *Структура и динамика молекулярных систем. Сб. статей*. Вып. X. **3**. Казань. Изд-во КГУ, 229 – 232 (2003).
11. Choo K.Y., Golden D.M., Benson S.V. *Intern. J. Chem. Kin.* **7**, 713-724 (1975).