Р. З. Гильманов, И. Ф. Фаляхов, Ф. Г. Хайрутдинов,
З. Г. Ахтямова, В. Г. Никитин, Т. Б. Гильманова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАКЦИИ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ В 3-ГАЛОГЕННИТРОПИРИДИНАХ

Ключевые слова: квантовохимический расчёт, 3-галогеннитропиридины, нуклеофильное замещение.

С помощью квантовохимических расчетов проведена оценка реакционной способности 3-галогеннитропиридинов в реакциях нуклеофильного замещения.

Keywords: kvantovochemical calculation, the 3-galogennitropiridins, nucleophilic replacement.

By means of kvantovochemical calculations the assessment of reactionary ability 3-galogennitropiridins in reactions of nucleophilic replacement is carried out.

3-Галогеннитропиридины являются наиболее ценными реагентами в ряду функциональных производных пиридина, на основе которых синтезированы эффективные биологически активные и энергоёмкие соединения [1,2].

Имеющиеся в литературе сведения по нуклеофильному замещению 3-галогеннитропиридинов весьма ограничены. В основном литературный материал посвящен активированному нуклеофильному замещению в 2- и 4-галогеннитропиридинах. Известно, что атом азота гетероцикла оказывает активирующее влияние на нуклеофильное замещение функциональных групп, расположенных в орто- и параположениях к нему. По силе эта активация приравнивается к активации, вызываемой нитрогруппой [3,4]. В 3-хлор-нитропиридинах наблюдается несовпадающее активирующее действие атома гетероцикла и нитрогруппы. Так, при рассмотрении формальной картины полярных взаимодействий в молекуле 3-хлор-2-нитропиридина (I) и 3-хлор-2,6-динитропиридина (II) можно утверждать, что хлор активируется к нуклеофильному замещению нитрогруппами, а нитрогруппа – атомом азота гетероцикла плюс атомом хлора:

На основе этого вполне обоснованным будет допущение о возможности нуклеофильного замещения по атому хлора и по нитрогруппе.

Имеющиеся экспериментальные данные полностью подтверждают эти результаты. Так, при обработке нуклеофильными реагентами 3-хлор-2-нитропиридина наблюдается замещение хлора и нитрогруппы [Ошибка! Залка не определена]:

Однако для 3-хлор-2,6-динитропиридина, по данным Кзуба и Плазека, [Ошибка! Залка не

определена.] замещению при действии аммиака, гидроокиси калия и гидразингидрата подвергается только нитрогруппа. Такие результаты требовали проверки и объяснения.

Для оценки характера распределения электронной плотности в молекулах 3-галогеннитропиридинов и их реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения были проведены квантовохимические расчеты некоторых моделей по методу ППДП/2 [7]. В качестве характеристик нуклеофильной реакционной способности рассматривали заряды на атомах q_i , энергии и коэффициенты атомных орбиталей c_i в нижней свободной молекулярной орбитали (НСМО) субстратов и в верхней занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) реагента. Анализ показал, что позиционную селективность анилина наиболее полно описывает заряд на углероде субстрата (табл.1).

Таблица 1 – Значения q_i на углеродных атомах пиридинового ядра (ЭВ)

Соединение	C ₄	C ₅	C ₆	C ₂	C ₃
3-Хлорпиридин	0,015552	-0,017255	0,082089	0,066417	0,106015
3-Хлор-2-нитропиридин	0,013443	0,003803	0,080261	0,087121	0,118301
3-Хлор-2,6-динитропиридин	0,013718	0,019490	0,105463	0,091218	0,129214
3-Хлор-2,4-динитропиридин	0,044357	0,010276	0,081798	0,089103	0,119699
3-Хлор-2,4,6-тринитропиридин	0,045570	0,023090	0,108437	0,093955	0,128910

Расчеты показали, что величины зарядов на атомах углерода, связанных с галогеном, несколько превышают заряды на атомах углерода, связанных с нитрогруппой, но являются величинами одного порядка. Это предполагает возможность атаки нуклеофила как по одному, так и по другому центру.

Отсутствие достаточного материала по кинетике нуклеофильного замещения в ряду хлорнитропиридинов привело к необходимости поиска корреляции по нитросоединениям бензольного и пиридинового рядов. Установлено, что квантовохимические параметры стационарного состояния молекул нитробензолов и нитропиридинов, такие как заряды на атомах ядра q_i , энергии валентных связей и полная энергия молекулы, не отражают нуклеофильную реакционную способность. Описание реакционной способности становится возможным,

если учесть взаимодействия субстрата например с анилином, а именно, рассчитать энергию возмущения [8]:

$$\Delta E = (q_C \cdot q_N) / (R \cdot \epsilon) + 2 \cdot (H \cdot \psi_d \cdot \psi_a^*) / (\epsilon_d \cdot \epsilon_a^*) + E_{\text{сop}},$$

где q_C , q_N – заряды атомов С и N в изолированных молекулах; ϵ – диэлектрическая проницаемость; R – расстояние между атомами С и N; $H\psi_d$, ψ_a^* – гамильтониан волновых функций взаимодействующих молекулярных орбиталей донора ψ_d и акцептора ψ_a^* ; ϵ_d , ϵ_a^* – граничные орбитальные энергии донора и акцептора.

Методом множественной корреляции найдено уравнение, связывающее $\lg K_{50}$ нуклеофильного замещения [9] с компонентами энергии возмущения и числом нитрогрупп в молекуле субстрата:

$$\lg K_{50} = -1,656 N^2 + 12,799 N - 24,970 - 258 \Delta E_{\text{кул}} / N - 0,75 \Delta E_{\text{орб}};$$

$$r = 0,991, S = 0,225, \Delta E_{\text{кул}} = (q_C \cdot q_N) / (R \cdot \epsilon), \Delta E_{\text{орб}} = H \cdot \psi_d \cdot \psi_a^* / (\epsilon_d \cdot \epsilon_a^*),$$

где N – число нитрогрупп в ядре.

Результаты расчетов значений $\lg K_{50}$ для 3-хлор-2,4,6-тринитропиридина и некоторых галогеннитробензолов [10] приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Кинетические параметры реакций нуклеофильного замещения

Соединение	Позиционная селективность		$\lg K_{50}$, л/моль·с	
	расчетная	экспериментальная	расчетная	экспериментальная
3-Хлор-2,4,6-тринитропиридин	3	3	0,70	-
3-Хлор-2,4,6-тринитробензол	3	3	0,50	0,52
3-Нитрозо-2,4,6-тринитробензол	3	3	0,40	0,29
4-Фтор-3,5-динитробензол	4	4	-1,86	-2,06
4-Хлор-3,5-динитробензол	4	4	-3,75	-3,7

Результаты квантовохимических расчетов показывают, что реакционная способность 3-хлор-2,4,6-тринитропиридина в два раза превышает таковую для хлортринитробензола. Такой результат не противоречит общим закономерностям, выявленным для производных галогеннитропиридинов. В ряде источников отмечается, что азот пиридина вызывает значительное возмущение электронных плотностей, что сравнимо с влиянием оказываемым нитрогруппой [11].

Так, энергия активации замещения в 2-хлор-3-нитропиридине сравнима с энергией активации хлора в 2,4-динитрохлорбензоле [12]. По данным

Талика реакционная способность 2-хлор-3,5-динитропиридина сравнима с хлортринитробензолом [13]. По Альберту реакционная способность азотистых гетероциклов определяется π -дефицитностью или π -избыточностью [14]. Пиридин является типичным представителем π -дефицитных систем. Введение дополнительных акцепторных заместителей – нитрогрупп – приводит к дальнейшему увеличению π -дефицитности системы. Поэтому 3-хлор-2,4,6-тринитропиридин по реакционной способности в реакции нуклеофильного замещения должен превосходить хлортринитробензол. Экспериментальное доказательство повышенной реакционной способности 3-хлор-2,4,6-тринитропиридина по сравнению с пикрилхлоридом будет представлено в следующих сообщениях.

Литература

1. Фаляхов И.Ф., Гильманов Р.З., Хайрутдинов Ф.Г., Шарнин Г.П., Ахтямова З.Г. Вестник КТУ, №10, (2010)
2. Гильманов Р.З., Фаляхов И.Ф., Хайрутдинов Ф.Г., Петров Е.С., Ахтямова З.Г. Вестник КТУ, №12, 30 (2012).
3. Chapman, N.B. Nucleophilic displacement reactions in aromatic systems / N.B. Chapman, C.W. Rees // J. Chem. Soc. – 1954. - P. 1190.
4. Cavell, E.A.S. Nucleophilic displacement reactions in aromatic systems. Part II. / E.A.S. Cavell, N.B. Chapman // J. Chem. Soc. – 1953. - P. 3392.
5. Ammers, M. The mercuration of pyridine N-oxide / M. Ammers, H. J. Hertog // Rec. trav. Chem. – 1958. – V.77. – V. 4. – P. 340.
6. Czuba, W. Uhtersuchengenbeber Nitroderivate des Pyriding / W. Czuba, E. Plazek // Rec. trav. Chem. - 1958. – V.77. – S. 92.
7. Popll, J.A. Aproximate molecular orbital theory / J.A. Popll, D.Z. Beveridge // Mc Grail Hill. – 1970. – V.1.
8. Клопман, Г. Реакционная способность и пути реакции / Г. Клопман. – М.: Мир, 1977.
9. Литвиненко, Л.М. Пространственное строение и реакционная способность. XIII. О взаимодействии удаленных друг от друга атомных группировок по данным исследования кинетики реакции аминопроизводных бифенила и стильбена с п-нитробензоилхлоридом и пикрилхлоридом / Литвиненко Л.М., Левченко Н.Ф. // ЖОХ. - 1959. - Т. 29. - № 3. - С. 924-935.
10. Parker, R.E. The mechanism of displacement reactions. Part III / R.E.Parker, T.O.Reaol // J. Chem. Soc. – 1962. - P. 3149.
11. Фойер, Г. Химия нитро- и нитрозогрупп / Г. Фойер . - М.: Мир, 1972. – Т. 1. – С. 443-444.
12. Cavell, E. A. Nucleophilic displacement reactions in aromatic systems. Part II. Kinetics of the reactions of chloronitropyridines and chloro-2,4-dinitrobenzene with 3-and-4-picoline / E. A. Cavell, N.B. Chapman // J.Chem.Soc. – 1953. – P.3392.
13. Talik, Z. The reactions of halogen derivatives of pyridine / Z. Talik // Roczniki chem. - 1960. – V.34. – P. 917.
14. Пожарский, А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов / А.Ф.Пожарский. – М.: Химия, 1985. – С. 53-59.

© Р. З. Гильманов – д-р хим. наук, проф. каф. химической технологии органических соединений азота КНИТУ
И. Ф. Фаляхов - д-р хим. наук, проф. той же кафедры; Ф. Г. Хайрутдинов – кан. хим. наук, доцент той же кафедры;
З. Г. Ахтямова – канд. хим. наук, доцент той же кафедры, zuhra-aprel@mail.ru; В. Г. Никитин – д-р хим. наук, профессор той же кафедры; Т. Б. Гильманова – канд. тех. наук, ассистент той же кафедры.